

物理学演習II 第12回 一次元の閉じ込め運動

2017年12月15日 担当：佐藤 純

問題1 [正準交換関係]

位置 x と運動量 p を表す演算子 \hat{x} , \hat{p} を

$$\hat{p}f(x) = -i\hbar \frac{d}{dx}f(x) = -i\hbar f'(x), \quad \hat{x}f(x) = xf(x)$$

で定義する.

(1-1) $\hat{x}\hat{p}f(x)$ を計算せよ.

$$\hat{x}\hat{p}f(x) = x \left(-i\hbar \frac{d}{dx}f(x) \right) = -i\hbar xf'(x)$$

(1-2) $\hat{p}\hat{x}f(x)$ を計算せよ.

$$\hat{p}\hat{x}f(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} \{xf(x)\} = -i\hbar \{(x)'f(x) + xf'(x)\} = -i\hbar f(x) - i\hbar xf'(x)$$

(1-3) これらの結果から、位置と運動量の交換関係 $[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$ を計算せよ.

$$[\hat{x}, \hat{p}]f(x) = \hat{x}\hat{p}f(x) - \hat{p}\hat{x}f(x) = i\hbar f(x)$$

より, $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$

問題2 [一次元運動]

ポテンシャル $V(x)$ の中で x 軸上を運動する質量 m の粒子を考える. この粒子の定常状態における波動関数 $\psi(x)$ は Schrödinger 方程式

$$\mathcal{H}\psi(x) = E\psi(x), \quad \mathcal{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

を満たす.

(2-1) ポテンシャルがないとき ($V(x) = 0$), 波動関数 $\psi(x) = A \exp\left(\frac{ip}{\hbar}x\right)$ は Schrödinger 方程式を満たすことを示し, エネルギー E を求めよ.

$$\mathcal{H}\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} A \exp\left(\frac{ip}{\hbar}x\right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{ip}{\hbar}\right)^2 \psi(x) = \frac{p^2}{2m} \psi(x)$$

より, $E = \frac{p^2}{2m}$

(2-2) 調和振動子ポテンシャル $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$ のとき, 波動関数 $\psi(x) = A \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right)$ は Schrödinger 方程式を満たすことを示し, エネルギー E を求めよ. (下図左参照)

$$\begin{aligned}\psi'(x) &= \left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right)' A \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) = -\frac{m\omega}{\hbar}xA \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right), \\ \psi''(x) &= \left(-\frac{m\omega}{\hbar}x\right)' A \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) - \frac{m\omega}{\hbar}x \left\{A \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right)\right\}', \\ &= -\frac{m\omega}{\hbar}A \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) + \left(-\frac{m\omega}{\hbar}x\right)^2 A \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right), \\ &= \left(\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}x^2 - \frac{m\omega}{\hbar}\right) A \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right)\end{aligned}$$

より,

$$\mathcal{H}\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}x^2 - \frac{m\omega}{\hbar}\right)\psi(x) + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi(x) = \frac{\hbar\omega}{2}\psi(x)$$

なので, $E = \frac{\hbar\omega}{2}$ を得る.

問題3 [一次元の閉じ込め運動]

ポテンシャル $V(x < 0) = V(a < x) = \infty$, $V(0 < x < a) = 0$ によって $0 < x < a$ の領域に閉じ込められた質量 m の粒子を考える. (下図右参照)

(3-1) 領域 $0 < x < a$ における Schrödinger 方程式 $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) = E\psi(x)$ の一般解を求めよ.

$$\psi''(x) = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x)$$

より, $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ とおくと, 一般解は $\psi(x) = A \cos kx + B \sin kx$ となる.

(3-2) 接続条件 $\psi(0) = \psi(a) = 0$ から, エネルギー E が量子化されることを示せ.

$\psi(0) = \psi(a) = 0$ より, $0 = \psi(0) = A \cos 0 + B \sin 0 = A$ より, $A = 0$ なので, $\psi(x) = B \sin kx$ となる. 次に, $\psi(a) = 0$ より, $B \sin ka = 0$ なので, $ka = n\pi$ (n は整数) となる. よって, $E = \frac{\hbar^2k^2}{2m} = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}n^2$ とエネルギーが量子化される.

(3-3) 確率の規格化条件 $\int_0^a |\psi(x)|^2 dx = 1$ から, 波動関数を決定せよ.

$$\begin{aligned}1 &= \int_0^a |\psi(x)|^2 dx = |B|^2 \int_0^a \sin^2 kx dx = |B|^2 \int_0^a \frac{1 - \cos 2kx}{2} dx \\ &= |B|^2 \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{4k} \sin 2kx \right]_0^a = |B|^2 \frac{a}{2}\end{aligned}$$

より, $B = \sqrt{\frac{2}{a}}$ なので, $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a}x$ となる.

